

**Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet FoNo VII-1/2017. sz. közleménye a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról**

2017. EüK. 9. szám közlemény 1 (hatályos: 2017.05.29 - )

A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadásának alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészeti kiadása – az alábbiak szerint – az *Alcoholum dilutum 70%* és a *Pulvis acidi ascorbici 200 mg* vényelőiratokkal egészül ki.

A FoNo VII-nek az OGYÉI jelen közleményével történő módosítása az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó.

**A FONO VII. ORVOSI KIADÁSA**

**Alcoholum dilutum 70%**

(Alc. dil. 70%)

*Dermatologicum. Antisepticum. Dezinficiens.*

ATC besorolás: D08AX08.

**Javallat:** az ép vagy enyhén sérült bőrfelület dezinficiálása.

**Rp.**

**Alcoholi diluti 70%**

*grammata quinquaginta (g 50,0)*

**D.:** ad vitrum fuscum.

**S.:** Külsőleg. Ecsetelésre.

**Hatóanyag**

**Alcoholum dilutum 70%:** *antisepticum, fertőtlenítő.*

**Mellékhatás:** sérült bőrfelületen csípő érzést okoz.

**A FONO VII. GYÓGYSZERÉSZI KIADÁSA**

**Alcoholum dilutum 70%**

(Alc. dil. 70%)

**Alcoholum dilutum 70% 50,0 g**

**Expedíció**

Jól záró, sötét üvegben.

**Szignatúra**

Külsőleg. Ecsetelésre.

**Dermatologicum. Antisepticum. Dezinficiens.**

**Hatóanyag**

**Alcoholum dilutum 70%:** antisepticum, fertőtlenítő.

**Javallat:** az ép vagy enyhén sérült bőrfelület dezinficiálása.

**Mellékhatás:** sérült bőrfelületen csípő érzést okoz.

A FONÓ VII. ORVOSI KIADÁSA

**Pulvis acidi ascorbici 200 mg**

(Pulv. acid. ascorb. 200 mg)

*Vitamin.*

ATC besorolás: A11GA.

**Javallat:** C-vitamin hiányos állapot kezelésére, reconvalescenciában, olyan betegek számára, akik a C-vitamin készítmények segédanyagaival szemben túlérzékenyek, vagy nyelési nehézséggel küzdenek.

**Rp.**

**Acidi ascorbici**

centigrammata viginti (g 0,20)

**Dentur tales doses No quinquaginta (L) ad capsulas cerates, ad scatulam.**

**S.: C vitamin pótlására naponta 1–2 port vízben vagy langyos teában feloldva bevenni.**

**Hatóanyag**

**Acidum ascorbicum:** antioxidáns, vízoldékony vitamin. Folyamatos bevitele szükséges, mivel a szervezet szintetizálni nem tudja. Koenzimként fontos szerepet tölt be a szervezet oxidációs-redukciós folyamataiban.

**Ellenjavallat:** vesekőbetegség az anamnézisben (magasabb dózisok esetében).

**Figyelmeztetés:** tartós, nagy dózisú alkalmazás hirtelen abbahagyásakor rebound jelenség léphet fel és következményes hiánytünetek jelentkezhetnek. Magasabb dózisok tartós alkalmazásakor megnő a vesekő képződésének kockázata. 14 év alatti életkorban előnyösebb a kisebb egyszeri C-vitamin adagok bevitele, ezért a készítmény alkalmazása nem javasolt.

**Gyógyszerkölsönhatások:** befolyásolhatja más hatóanyagok felszívódását és egyes laboratóriumi vizsgálatok eredményét.

**Mellékhatás:** hasmenés, gyomorirritáció előfordulhat.

**Megjegyzés:** 10,0 g expediálható osztatlan por formájában, cerátzacskóban, dobozban, 200 mg aszkorbinsav kimérésére alkalmas adagolókanállal. Ebben az esetben a címkeszöveg az alábbiak szerint változik:

**S.: C-vitamin pótlására naponta 1-2 adagolókanálnyi mennyiséget vízben vagy langyos teában feloldva bevenni.**

A FONO VII. GYÓGYSZERÉSZI KIADÁSA

**Pulvis acidi ascorbici 200 mg**

(Pulv. acid. ascorb. 200 mg)

**Acidum ascorbicum 10,0 g**

50 db osztott porra

**Expedíció**

Cerátkapszulában, kartondobozban.

**Szignatúra**

C vitamin pótlására naponta 1-2 port vízben vagy langyos teában feloldva bevenni.

**Vitamin.**

**Hatóanyag**

**Acidum ascorbicum:** *antioxidáns, vízdékony vitamin. Folyamatos bevitele szükséges, mivel a szervezet szintetizálni nem tudja. Koenzimként fontos szerepet tölt be a szervezetben az oxidációs-redukációs folyamatokban.*

**Javallat:** C-vitamin hiányos állapot kezelésére. Reconvalescenciában, olyan betegek számára, akik a C-vitamin készítmények segédanyagaival szemben túlérzékenyek, vagy nyelési nehézséggel küzdenek.

**Ellenjavallat:** vesekőbetegség az anamnézisben (magasabb dózisok esetében).

**Figyelmeztetés:** tartós, nagy dózisú alkalmazás hirtelen abbahagyásakor rebound jelenség léphet fel és következményes hiánytünetek jelentkezhetnek. Magasabb dózisok tartós alkalmazásakor megnő a vesekő képződésének kockázata. 14 év alatti életkorban előnyösebb a kisebb egyszeri C-vitamin adagok bevitele, ezért a készítmény alkalmazása nem javasolt.

**Gyógyszerkölcsonhatások:** befolyásolhatja más hatóanyagok felszívódását és egyes laboratóriumi vizsgálatok eredményét.

**Mellékhatás:** hasmenés, gyomorirritáció előfordulhat.

**Megjegyzés:** 10,0 g expediálható osztatlan por formájában, cerátzacskóban, dobozban, 200 mg kimérésére alkalmas adagolókanállal.

Ebben az esetben a **Szignatúra** a következőképpen módosul:

C-vitamin pótlására naponta 1-2 adagolókanálnyi mennyiséget vízben vagy langyos teában feloldva bevenni.