

**A GYEMSZI – Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága FoNo VII.-1/2013.  
számú közleménye  
a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról**

hatályos: 2013.09.30 –

2013. EüK. 14. szám

A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása az alábbiak szerint módosul.

A FoNo VII.-nek a GYEMSZI – Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság jelen közleményével történő módosítása az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó.

A FoNo VII. orvosi kiadása

✱

**SUPPOSITORIUM HAEMORRHOIDALE**

Antihaemorrhoidalis adstringens. Antiphlogisticum. Anaestheticum.

Javallat: Nodus haemorrhoidalis.

**Rp.**

**Ephedrinii chlorati**

centigrammata tria (g 0,03)

**Lidocaini**

centigrammata octo (g 0,08)

**Bismuthi subgallici**

**Zinci oxydati**

**Balsami peruviani**

aa centigrammata decem(aa g 0,10)

**Acidi silicici colloidalis hydrophyli**

centigrammata quinque (g 0,05)

**Olei ricini**

centigrammata quattuor (g 0,04)

## **Vehiculi**

quantum satis

## **M.f. suppositorium.**

**Dentur tales doses No decem (X)**

## **D. ad scatulam**

**S.:** Végbélkúp. 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 2-szer. Hűvös helyen tartandó.

**Megjegyzés:** Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie. A kúp alkalmazása lehetőleg székelés és tisztasági lemosás után történjék.

## **Hatóanyagok:**

**Ephedrinium chloratum<sup>a</sup>:** Sympathomimeticum, mely az adrenalinhoz képest tartósabban, de enyhébben hat.

**Lidocainum<sup>b</sup>:** Savamid típusú, membránstabilizáló hatásmechanizmusú localanaestheticum. Hatása gyorsan beáll, hatástartama rövid. Gátolja mind az ingerület kifejlődését, mind tovaterjedését.

**Bismuthum subgallicum<sup>c</sup>:** Antiphlogisticum, antisepticum, sebszárító, hámosodást elősegítő.

**Zincum oxydatum<sup>d</sup>:** Enyhe adstringens.

**Balsamum peruvianum<sup>e</sup>:** Enyhe antisepticum és hámosodást elősegítő.

**Ellenjavallat:** Instabil angina<sup>a</sup>, cardialis arrhythmia<sup>a</sup>, nem kontrollált magas vérnyomás<sup>a</sup>, porphyria<sup>a</sup>. Túlérzékenység<sup>a,c</sup>. Veseelégtelenségben szenvedő betegeknek bizmut adása ellenjavallt<sup>c</sup>.

**Figyelmeztetés:** Cardiovascularis megbetegedésben csak a haszon/kockázat arányának figyelembevételével alkalmazható<sup>a</sup>. Terheseknek ne adjuk<sup>a,c</sup>. A bizmut átjut a placentán.

**Mellékhatás:** Efedrin túlérzékenység<sup>a</sup> (szorongás<sup>a</sup>, álmatlanság<sup>a</sup>, szédülés<sup>a</sup>, tachycardia<sup>a</sup>, extrasystole<sup>a</sup>, hányinger<sup>a</sup>, hányás<sup>a</sup>). Túlérzékenységi reakció<sup>b</sup>, oedema<sup>b</sup>, igen ritkán anaphylactoid reakció<sup>b</sup>, de nem ad keresztreakciót az észter típusú helyi érzéstelenítőkkel (pl. prokain). Allergiás reakciót válthat ki<sup>c</sup>.

A FoNo VII. gyógyszerészi kiadása

✘

## SUPPOSITORIUM HAEMORRHOIDALE

- I. **Ephedrinum chloratum** 0,30g
- I. **Lidocainum** 0,80g
- I. **Bismuthum subgallicum** 1,0g
- I. **Zincum oxydatum** 1,0g
- I. **Acidum silicicum colloidalde hydrophylum** 0,50g
- II. **Adeps solidus 50** 4,0g
- III. **Balsamum peruvianum** 1,0g
- III. **Oleum ricini** 0,40g
- IV. **Adeps solidus 50** qu.s

10 db végbélkúpra

### **Készítés:**

Az I. alatti alkotórészek homogén keverékét a megolvasztott II. kb. 40 °C hőmérsékletű olvadékával gondosan eldörzsöljük. A szuszpenzióban a III. alatti alkotórészeket keveréssel eloszlatjuk, majd a kúpmasszát a megolvasztott IV. szükséges mennyiségével elkeverjük, s a szuszpenzióból kb. 2 g átlagtömegű kúpotat készítünk.

### **Expedíció:**

Egyenként kasírozott alumíniumfóliába burkolva, kartondobozban.

### **Szignatúra:**

Végbélkúp. 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 2-szer.

Hűvös helyen tartandó.

**Antihaemorrhoidalis adstringens. Antiphlogisticum. Anaestheticum.**

### **Megjegyzés:**

Csak vényre adható ki.

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.

A kúpot lehetőleg székelés és tisztasági lemosás után kell bevezetni.

### **Hatóanyagok:**

**Ephedrinium chloratum<sup>a</sup>:** Sympathomimeticum, mely az adrenalinhoz képest tartósabban, de enyhébben hat.

**Lidocainum<sup>b</sup>:** Savamid típusú, membránstabilizáló hatásmechanizmusú localanaestheticum.

Hatása gyorsan beáll, hatástartama rövid. Gátolja mind az ingerület kifejlődését, mind tovaterjedését.

**Bismuthum subgallicum<sup>c</sup>:** Antiphlogisticum, antisepticum, sebszáritó, hámosodást elősegítő.

**Zincum oxydatum<sup>d</sup>:** Enyhe adstringens.

**Balsamum peruvianum<sup>e</sup>:** Enyhe antisepticum és hámosodást elősegítő.

**Javallat:** Nodus haemorrhoidalis.

**Ellenjavallat:** Instabil angina<sup>a</sup>, cardialis arrhythmia<sup>a</sup>, nem kontrollált magas vérnyomás<sup>a</sup>, porphyria<sup>a</sup> Túlérzékenység<sup>a,e</sup>. Veseelégtelenségben szenvedő betegeknek bizmut adása ellenjavallt<sup>c</sup>.

**Figyelmeztetés:** Cardiovascularis megbetegedésben csak a haszon/kockázat arányának figyelembevételével alkalmazható<sup>a</sup>. Terheseknek ne adjuk<sup>a,c</sup>. A bizmut átjut a placentán.

**Mellékhatás:** Efedrin túlérzékenység<sup>a</sup> (szorongás<sup>a</sup>, álmatlanság<sup>a</sup>, szédülés<sup>a</sup>, tachycardia<sup>a</sup>, extrasystole<sup>a</sup>, hányinger<sup>a</sup>, hányás<sup>a</sup>). Túlérzékenységi reakció<sup>b</sup>, oedema<sup>b</sup>, igen ritkán anaphylactoid reakció<sup>b</sup>, de nem ad keresztreakciót az észter típusú helyi érzéstelenítőkkel (pl. prokain). Allergiás reakciót válthat ki<sup>e</sup>.