

**Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet FoNo VII-1/2019. sz. közleménye  
a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról**

2019. EüK. 4. szám közlemény 6

hatályos 2019.03.01 -

A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadásának alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészeti kiadása a *Solutio merbromini* vényelőirat esetén – az alábbiak szerint – módosul.

A FoNo VII.-nek az OGYÉI jelen közleményével történő módosítása az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételét követő 5. naptól alkalmazandó.

Orvosi cikkely



**Solutio merbromini**

(Sol. merbromin.)

*Dermatologicum. Antisepticum.*

ATC besorolás: antiszeptikumok és fertőtlenítők – higanytartalmú készítmények – merkurokrom D08AK04.

**Javallat**

Bacteriális, gombás bőrfertőzés.

**Rp.**

**Merbromini**

gramma semis (g 0,50)

**Aquae purificatae**

ad grammata viginti quinque (ad g 25,0)

**M. f. solutio.**

**D. ad vitrum fuscum.**

**S.: Külsőleg. Dezinficiáló ecsetelő.**

**Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.**

**Fontos tudnivalók**

Erős hatású szert tartalmaz. Kizárólag megrendelőlapon rendelhető, és csak egészségügyi szolgáltató intézményben alkalmazható. Alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a fertőzés más szerrel nem szüntethető meg. A lehető legkisebb bőrfelületen, legfeljebb néhány napon át alkalmazható.

### **Hatóanyagok**

**Merbrominum:** *fertőtlenítőszer, szerves higanyvegyület.*

### **Ellenjavallat**

Ismert higany-túlérzékenység.

### **Figyelmeztetés**

A szöveti törmelék gátolhatja a kezelés hatását. Nagyobb vagy hámfosztott területről a hatóanyag felszívódik és a higanymérgezés különböző fokozatait okozhatja (pl. aplasticus anaemia). Nyálkahártyára, szembe, szájba nem kerülhet. Terhesség, szoptatás alatt alkalmazása nem ajánlott.

### **Kölcsönhatás**

Jódos fertőtlenítővel együtt nem alkalmazható.

### **Mellékhatás**

Dermatitis. Túlérzékenységi reakció, contact dermatitis.